

Prodajni program kompanije Agro Group iz Brčkog za 2025.godinu

**Gradiška, 04-05.03.2025.
Natalija Kurjak,dip.ing.**

Agro Group doo Brčko: Ko smo mi?



- Kompanija sa tradicijom dugom **25 godina**
- Trgovačko preduzeće u privatnom vlasništvu za trgovinu žitaricama i uljaricama
- Sjedište kompanije u Brčkom. Ogranak kompanije u Šamcu (PIK Šamac)
- Skladišni kapaciteti: 20.000 t u Šamcu i podno skladište od 1.000 t u Brčkom
- Proizvodni asortiman : mineralna đubriva, repromaterijal za sjetvu, gotova stočna hrana i premiksi
- Ekskluzivni uvoznik i distributer pesticida za BiH kompanije Savacop iz Srbije

Vaš partner sa širokim portfoliom i logističkom podrškom!!

Agro Group: u brojkama!



- Danas Agro Group ima **23 zaposlenih**,
- Preko **1.500 poslovnih partnera** o kojima brine prodajni i stručni tim
- Prodajni portfolio koji broji **više od 80 artikala**
- **Godišnji promet** kompanije od preko **45.000 t roba**
- **Otkup i prodaja žitarica** na domaćem i ino tržištu (pšenica, ječam, raž, kukuruz)
- **Trgovina i otkup** sa sojom, suncokretom, uljanom repicom, sojinom, suncokretovom, sačmom uljane repice
- **Obezbeđenje mineralnih đubriva: NPK, KAN, AN, Urea**
- **2025. godine plasirana NPK 16:16:16 pod brendom Agro Group**

Vaš partner sa širokim portfoliom i logističkom podrškom!

Agro Group: DDGS novi proizvod!



- **Osušena zrna destilatora sa rastvorljivim materijama, ili DDGS,**
- **koristan nusproizvod iz ciklusa proizvodnje etanola.**
- **Proizvodi se u poslednjem procesu stvaranja etanola, u kojem skrob, u ovom slučaju zrna pšenice, fermentira, kako bi se proizveo etanol, a komponente protein, vlakna, masti ostaju.**
- **Hranjivi sastojci proteina, vlakana i masti koji ostaju nakon fermentacije se dalje suše kako bi se dobio DDGS.**

Vaš partner sa širokim portfoliom i logističkom podrškom!

Agro Group: DDGS novi proizvod!



- DDGS je izvanredan izvor proteina i energije.
- DDGS opskrbljuje korisne aminokiseline, minerale i vitamine.
- Probavljiva vlakna pomažu poboljšanju zdravlja buraga krava i optimizaciju njihove upotrebe u formulacijama ishrane za životinje.
- Nivo proteina kod DDGS-a je uporediv sa otpadnim zrnom pivskog kvasca i nalazi se iznad zrna kukuruza.
- DDGS može zamijeniti skuplje izvore proteina u raznim ishranama stoke jer sadrže dobro izbalansiran sastav esencijalnih aminokiselina.
- **Ne sadrži aflatoksin i druge toksine**

Vaš partner sa širokim portfoliom i logističkom podrškom!

Agro Group: DDGS novi proizvod!



Agro Group doo Brčko: đubriva



- NPK 16:16:16, brend Agro Group, porijeklo Rusija
- Pakovanje big bag (600 kg) i 25/1 na paletama (1.375 kg)
- Ponuda kompaktnih mineralnih đubriva proizvođača

Adriatic Vukovar raznih formulacija:

NPK 7:20:30

NPK 5:15:15;

NPK 15:15:15;

NPK 6:12:24:

NPK 8:16:24;

PK 20:30



Vaš partner sa širokim portfoliom i logističkom podrškom!!

Ekskluzivni uvoznik i distributer Savacoop programa Agro Group doo iz Brčkog



Distributivni centar kompanije Savacoop Novi Sad



Zašto Savacoop generički proizvodi ?

- **Pažljivo odabrano.**
- Za svaki proizvod birani su dobavljači koji imaju visok kvalitet i dokumentaciju pripremljenu za EU („ 5 batch analysis“)
- Odabrani su najveći kineski proizvođači za pojedinačne aktivne supstance
- Određeni dobavljači su već registrovali svoje aktivne supstance u EU i dobavljači su internacionalnih kompanija
- Primjer 1: Jinfanda je dobavljač glifosata za Bayer/Monsanto i Adamu
- Primjer 2: Rainbow je ponudio kaptan u dva kvaliteta: standard i EU. Savacoop kupuje Belagio u EU kvalitetu
- Kompanija Rainbow je registrovala u EU čak 50 aktivnih supstanci
- Nekoliko dobavljača Savacoop-a priprema registraciju gotovih proizvoda u EU



Zaštita i folijarna ishrana pšenice

Akteon Forte (tebukonazol) 0,35 l/ha

Calliope Pro (difenokonazol +
azoksistrobin) 0,6-0,8 l/ha

Pegassus (protiokonazol
250 g/l) 0,8 l/ha

Pegassus Duo (protiokonazol 200 g/l) + piraklostrobin 170 g/l 0,6--1 l/ha


Savate CS (Lambda-cihalotrin 0,2 l/ha ili Decaguard 250 EC (deltametrin) 0,3 l/ha

Lebosol Cereale Mix 1-2 l/ha

Lebosol Nutriplant 36 5 l/ha


Lebosol Nutriplant 3-5 l/ha

Levanto Max 0,25 g/ha



Napomjena : Uz prvi tretman i tretman u cvjetanju preporučuje se dodatak okvašivača Torkan 0,15 % (0,3 l/200 l)

Zaštita kukuruza od korova



PRE-EM

RANI POST

POST EM

Capone® (terbutilazin)
Sikario® (glifosat)

Capone® (terbutilazin)
Fontan® (dikamba)

Cornisto® (mezotrion)
Cornisto® Pro (mezotrion+nikosulfuron)
Mentor® (nikosulfuron)
Capone® (terbutilazin)

Zaštita kukuruza od korova PEM (posle setve, a pre nicanja)



Muhar - *Setaria*



Koštan - *Echinochloa*



Svračica - *Digitaria*



Divlji sirak (iz semena) - *Sorghum*

Capone[®] 1l/ha

Zaštita kukuruza od korova PEM (posle setve, a pre nicanja)

- Ukoliko su problem već iznikli korovi (jednogodišnji i višegodišnji) primeniti kombinaciju

Capone[®] 1l/ha + Sikario[®] 3l/ha

- Sikario (a.m. glifosat) je translokacioni, neselektivni herbicid
- Ova herbicidna kombinacija je široko zastupljena u najznačajnijim kukuruznim regionima u Srbiji
- **Primeniti isključivo pre nicanja kukuruza. Najbolje i najsigurnije je odmah iza setve!!!**
- Ukoliko je kao korov dominantna palamida, umesto glifosata primeniti preparat na bazi 2,4D (2l/ha)

Zaštita kukuruza od korova (posle nicanja kukuruza i korova)



Muhar - *Setaria*



Muhar - *Setaria*

Fontan[®] (dikamba) 0,5-0,7l/ha

Kukuruz do faze 5.lista, korovi od 2-6 listova

Idealan partner je Capone 0,5-1l/ha; dodati Lebosol Mais Spezial 2-3l/ha

Zaštita kukuruza od korova (poslije nicanja kukuruza i korova)



Pomoćnica – *S.nigrum*



Tatula – *D.stramonium*



Ambrozija - *Ambrosia*

Fontan[®] (dikamba) 0,5-0,7l/ha

Kukuruz do faze 5.lista, korovi od 2-6 listova

Idealan partner je Capone 0,5-1l/ha; dodati Lebosol Mais Spezial 2-3l/ha

Fontan® 0,6 l/ha + Capone® 1 l/ha



Cornisto[®] (mezotrion 480 g/l)

Cornisto[®]

- Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu
- Primena od 2-8. lista kukuruza
- Doza primjene 0,15-0,25 l/ha
- Dobro suzbija: pepeljuge, štireve, pomoćnicu, tatulu, dvornike, čičak...



Mentor[®] (nikosulfuron 40 g/l)

Mentor[®] OD

- Herbicid za suzbijanje svih travnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
- Primjena od 2-8. lista kukuruza
- Doza primjene: 1,25 -1,5 l/ha
- Radi boljeg usvajanja herbicida dodati prilikom primene **Lebosol Nutriplant 36** (tečna urea) - 5l/ha



Cornisto[®] Pro (mezotrion 75 g/l + nikosulfuron 30 g/l)

Cornisto[®] Pro

- Herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu
- Primjena od 2-8. lista kukuruza
- **Doza primjene 1,5 -1,8 l/ha**
- Doza primjene od 1,5 l/ha odgovara miksu punih doza mezotriona i nikosulfurona



Cornisto® Pro Ostavlja čisto za sobom !

Agro Group tehnologija

Cornisto® Pro 1,5 l/ha
+
Capone® 1 l/ha

- Primjenjeno oko 5 lista kukuruza



Milan Konjević, Gornja Rogatica, Maj 2022.

Agro Group tehnologija u kukuruзу u najtežim uslovima


Pre tretmana



Četiri dana posle tretmana



2 nedelje nakon tretmana



ATIS® (acetamiprid 200 g/kg)



- Sistemični insekticid za suzbijanje lisnih vaši
- Jedini preostali neonikotinoid na tržištu
- **Količina primjene: 250-500g/ha**
- Koristi se u početku vegetacije
- Za suzbijanje tvrdokrilaca i popaca se kombinuje sa Savate®CS i to:
Atis 200g/ha + Savate CS 300ml/ha
- Pakovanje: 5g; 25g; 250g; 1kg

BANZAI® (flonikamid 500 g/kg)



Primena:

- Suzbijanje lisnih vaši u jabuci, paprici, paradajzu i krastavcu
- Količina primene: 0,06 – 0,1 – 0,14kg/ha
- Vreme primene: na početku formiranja prvih kolonija lisnih vaši
- Karenca: krastavac i paradajz – 1 dan; paprika – 5 dana;

FINEY (abamektin 18 g/l)

- Translaminarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Inhibira protok jona hlora kroz nervne membrane insekata.

Preporuka:

- **Suzbijanje običnog paučinara (*Tetranychus urticae*) 0,75l/ha**
- **Suzbijanje eriofidne grinje maline (*Phyllocoptes gracillis*) 1-1,25l/ha**

- Formulacija: emulzija ulja u vodi – EW (ne treba mu dodatak okvašivača)

- Vreme primene: nakon pojave prvih jedinki (*T.urtice*); rano s proleća, kada grinje migriraju na list (*Ph.gracillis*) i u jesen, pre migracije prema pupoljcima

- Pakovanje: 1l; 100ml;



Tetranychus urticae



Simptomi na malini (*Ph.gracillis*)

LARISSA® (spinosad 240 g/l)



Simptomi napada tripsa na listu krastavca



Leptiri jabukovog smotavca u feromonskoj klopki



Položena jaja na plodu

- Sistemični insekticid sa kontaktnim i **digestivnim** delovanjem.

Registracija:

Jabuka – smotavac 0,4l/ha; Krastavac - trips (*F.occidentallis*) – 0,4l/ha (!?)

- Vreme primene: nakon pojave prvih jedinki tripsa; 7-10 dana nakon maksimalnog leta leptira j.smotavca
- Karenca: 3 dana; Pakovanje: 1l; 100ml; 5ml

LARISSA® (spinosad 240 g/l)



Simptomi napada tripsa na listu i plodu paradajza

Mogućnosti primene u drugim kulturama:

Suzbijanje tripsa u paradajzu i paprici – 0,4-1l/ha

- Niže doze se koriste za suzbijanje duvanovog tripsa, a više za cvetnog tripsa
- Vreme primene: nakon pojave prvih jedinki, **obično u vreme cvetanja prvog sprata**

MIMAS® (hlorantraniliprol 200g/l)



Moljac paradajza i oštećenja na listu

- Pakovanje: 1l; 100ml

- Larvicidni insekticid sa kontaktnim i **digestivnim delovanjem**. Izaziva nagomilavanje kalcijuma u tkivima insekata.
- Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC

Registracija: suzbijanje jabukovog smotavca (*Cydia pomonella*) - 0,016-0,02%

Primena: suzbijanje gusenica u voću i povrću (larve sovice i moljaca) i nekih tvrdokrilaca – 0,016-0,2l/ha (0,3l/ha je zaživelo u praksi)

- Vreme primene: **pre** ili u vreme polaganja jaja i na početku piljenja gusenica

Kombinacije za suzbijanje krompirove zlatice



➤ **Mimas® 60ml/ha + Finey 300ml/ha**

- Praktično: paket Mimas® 1l + Finey 5l za 17ha površine
- Još bolje: Mimas 2x100ml + Finey 1l za 3,3ha
- Mnogo jeftinije od originala!!!
- .

➤ **Mimas® 50ml/ha + Larissa® 50ml/ha**


- Praktično: paket Mimas® 1l + Larissa® 1l za 20ha površine ili **Mimas® 100ml + Larissa® 100ml za 2ha površine.**

CALLIOPE® (azoksistrobin 250g/l)




- Količina primene: 0,75l/ha (0,075%) – krompir, paradajz, malina
- Vreme primene: pre pojave simptoma, **u vreme izrazito povoljnih uslova za zaražavanje**
- Iskustveno: 1l/ha, isključivo preventivno, završni tretmani
- Maksimalan broj tretiranja: 3 puta u toku godine
- **Pakovanje: 100ml, 1l**

NUMA® (fluazinam 500g/l) – proizvod umesto mankozeba



- Količina primene: 0,3-0,4l/ha; 1l/ha (jabuka)
- Vreme primene: pre pojave simptoma, **u vreme izrazito povoljnih uslova za zaražavanje, sprečava silazak zoospora na krtole(!) veoma značajno za čuvanje!!!**
- Iskustveno: obavezni završni tretmani, **teško se spira prirodnom i veštačkom kišom**
- Maksimalan broj tretiranja: 3 puta u toku godine

KAPOERA® (difenokonazol 250g/l)



- Količina primene: 0,5l/ha
- Suzbijanje crne pegavosti - *Alternaria*
- Vreme primene: pre pojave simptoma, u vreme izrazito povoljnih uslova za zaražavanje, odličan partner za Numa® i ostale fungicide protiv plamenjače
- Maksimalan broj tretiranja: 3 puta u toku godine
- Pakovanje: 1l

RHEA® (pirimetaniil 400g/l)



Primena:

- Suzbijanje sive plesni (*Botrytis cinerea*)
- Količina primene: 2-2,5 l/ha
- Vreme primene: od početka cvetanja do plodonošenja– **najjeftiniji za ovu namenu**
- Iskustveno: od pojave cvetnih pupoljaka–tokom razvoja plodića–do 14 dana pre

Siva plesan uvek počinje da se razvija od peteljke!

CELLUS TOP® - standard protiv truleži



Sadržaj: ciprodinil 375g/kg + fludioksonil 250g/kg

Primena:

- Povrtarske kulture: protiv **sive plesni**, bele truleži i **antraknoza**
- Količina primene: 0,8-1 kg/ha
- Vreme primene: pre ostvarene infekcije (najteži period za zaštitu počinje od cvetanja paprike)

➤ Pakovanje: 8g; 200g;

Folijarna ishrana



Lebosol



Kvalitet od samog početka

Vrhunska nemačka folijarna đubriva

- Specijalna đubriva visokih performansi
- Vrhunski kvalitet – od sadržaja do ambalaže
- Inovativne formulacije



Lebosol Bor

Sastav:

150 g/l vodorastvorljivog bora
u obliku bor-etanolamina

Razlog primjene

Promoviše cvjetanje, razvoj i klijanje
polenovih cevčica, **bolju oplodnju,**
razvoj pravilnih plodova.

Reguliše transport kalcijuma i razvoj
pokožice ploda

Obavezna primjena: voće,
povrće. Sve više soja i suncokret



Doza primjene:

1-2l/ha

Lebosol 

Lebosol® Calcium Forte

Sastav:

14% vodorastvorljivog kalcijuma u obliku kalcijum formijata **260 g/l**

CaO

7% bora

1,5% mangana u obliku mangan karbonata

0,7% cinka u obliku cink-oksida



Razlog primene:

Kalcijum formijat – najbolje usvajanje

Bez azota – primena tokom cele vegetacije

Čvršća pokožica ploda, sprečavanje vršne truleži, stabilno skladištenje, otpornost, **poboljšana mogućnost transporta**



Lebosol 

Šta je važno kod odabira kalcijuma ?

Oblik kalcijuma u proizvodu:

1. **CaNO₃** - proizvodnja direktno iz sirovine (jeftino)
 - primena najkasnije do juna – provocira neželjeni porast mladara
 - dobro mešanje
2. **CaCl₂** - najjeftiniji oblik kalcijuma
 - najagresivniji – potencijalne fitotoksije
 - oštećenje protivgradne mreže (skraćuje vek trajanja)
 - nepogodan za mešanje, sporije usvajanje
3. **Ca** – acetat – dobro usvajanje
 - manje agresivan
 - sirćetni miris (privlači *Drosophila suzukii*, ose ...) – ne koristiti u grožđu i voću osetljivom na napad drozofile !

Lebosol® Nutriplant 36

Sastav:

Ukupan azot -N (350 g/l)

18,7% UREA azota

4,7% nitratnog azota

3,6% amonijačnog azota

3% vodorastvorljivog Mg

ME 0,01% B, 0,01% Mn, 0,005% Cu, 0,01% Zn



Zašto Lebosol® Nutriplant 36 ?

Tečno azotno đubrivo nemačkog kvaliteta

1. Povećava sadržaj proteina i prinos pšenice
2. Poboljšava rast kukuruza i efikasnost herbicida
3. Univerzalna primena



Lebosol 

Lebosol® Nutriplant 36

Sastav:

Ukupni azot **360 g/l**

Azot u obliku uree 240g

Amonijačni azot 50g/l

Nitratni azot 70g/l

MgO 40g/l

Mikrolementi: B, Cu, Mn, Zn



Zašto Lebosol® Nutriplant 36?

Tečna urea – bolje rastvaranje

Bez biureta – produkt koji prati proizvodnju uree u čvrstom obliku

Biuret je štetan po biljke

pH = 6-8

Količina primene: 5-10l/ha

Vreme primene: od početka vegetacije do pred cvetanje






Hvala na pažnji!
www.agrogroup.org

